

Edirne Yerlileri İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Trakya Tosbağası



- Karada yaşayan bir kaplumbağa türüdür.
- Avrupa kıtasında yaşarım. Türkiye'de sadece Trakya bölgesinde bulunduğu için Trakya tosbağası diye bilinir.

Yer Yediuyuru



- Yaşlı meşe ormanları, tarım arazileri arasında kalmış böğürtlenlik alanlar, meyve bahçeleri ve bağlık alanlarda yaşar.
- Dünyada Bulgaristan ve Türkiye (Edirne, Tekirdağ, Çanakkale)'de bulunur.
- Meyve, tohum, küçük omurgalı ve omurgasız hayvanları yiyerek beslenir.

Edirne Sümbülü



- Dünya’da Türkiye’den sonra Yunanistan’da akrabam saptanmış olmasına rağmen endemiğim ve neslim tehlike altındadır.
- Yaşam ortamım genellikle taban suyu yüksek çayır, mera, otlaklar ve tarla kenarlarıdır. Bu yüzden de tarımsal ve otlatma baskısıyla karşı karşıyadır.
- 1988 yılında keşfedilerek bilim dünyasına tanıtılmıştır.

Rumeli Çançiçeği



- Dünyada Yunanistan ve Bulgaristan’da yayılış gösterirken Türkiye’de ilk kez 1993 yılında Mecidiye kayalıklarından akrabalarım toplanmış ve Türkiye için yeni kayıt olarak *Trachelium jaquini* adı verilmiştir. Daha sonra yapılan incelemelerle farklılığım ortaya konuldu ve *T. jaquini* subsp. *Dalgiciorum* olarak isimlendirilir.
- Uzun yıllar sadece bu bölgede bilinen bir endemik tür olarak kaldım.
- 2012 yılında yayımlanan Türkiye Bitki Listesinde *Campanula rumeliana* subsp. *rumeliana* ismini almıştır.
- Türkiye’de sadece Mecidiye-İbrice Limanı arasında ve İtalyan Koyu civarındaki tepeliklerde bulunan çıplak kalker kayalıklarında bulunur.

Garip Lale



- Dünya'da Bulgaristan ve Türkiye'de bulunur.
- Türkiye'de Edirne, Çanakkale ve Kırklareli'nde yaşadığı tespit edilmiştir.

Şehit Karanfili



- Dünyada Türkiye ve Yunanistan'da yayılış gösterir.
- Neslim tehlike altında olan endemik bitki türüdür.
- Türkiye'de Edirne ve Çanakkale illerimizde yayılış gösterir.

Avrupa Kırmızı Orman Karıncası



- Türkiye'de sadece Trakya Bölgesi'nde yayılış göstermektedir.
- Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği Kırmızı Liste kategorisinde NT (Tehdide Yakın), Türkiye Ulusal Kırmızı Liste kategorisinde CR (Kritik) ve Trakya Bölgesi için ise VU (Hassas) olarak değerlendirilmektedir.
- Zararlı böceklerle beslenerek biyolojik kontrol sağladığından dolayı yuva miktarının ideal seviyeye kadar artmasının ekosistem üzerindeki olumlu etkisi kısa vadede gözlemlenebilmektedir.

Sultan Papatyası



- Türkiye'den sadece Edirne ve Çanakkale'de yayılış göstermektedir.
- Endemik ve nesli tehlike altında bir türdür.

Boğaz Keteni



- *Linum tauricum* türünün yayılış alanı Kırım, B. Kafkasya ve Balkanlar'dır.
- subsp. *bospori* alttürü ise sadece İstanbul, Edirne ve Tekirdağ'dan bilinmektedir.
- Adını İstanbul Boğazı'ndan alan, şehrin en nadir bitkilerinden biridir.
- Doğal yaşam alanı kumullar, meralar şehirleşmeyle kayboluyor.